


ALLEGATO P3 – Aggiornamento parziale Aprile 2014

FARMACI CON EVIDENZA SCIENTIFICA A SUPPORTO DELL'USO IN PEDIATRIA PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE

LISTA ANESTETICI E FARMACI PER IL DOLORE

Principi attivi	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Utilizzo off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno dell'indicazione terapeutica richiesta	Indicazione pediatrica Guida Uso Farmaci nei Bambini 2003	Indicazione pediatrica BNF for Children 2010-2011	Note
<b>Analgesci</b>							
Morfina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• premedicazione</li> <li>• trattamento del dolore acuto</li> <li>• trattamento del dolore cronico</li> <li>• sedazione ICU</li> </ul>	<p>Autorizzata in premedicazione per via im nel bambino.</p> <p>Autorizzata nel trattamento del dolore acuto per via sc, im e ev a partire dall'età neonatale.</p> <p>Autorizzata nel trattamento del dolore cronico per os a partire da 1 anno di vita.</p> <p><b>ORAMORPH:</b>                      Contenitore monodose: Bambini tra i 6 e 12 anni: la dose massima è di 5-10 mg (1/2-1 contenitore monodose da 10 mg) ogni 4 ore</p> <p>Soluzione orale: Bambini tra i 6 e i 12 anni: la dose massima è di 5-10 mg ogni 4 ore (pari a 0,25-0,5 ml oppure a 4-8 gocce)</p> <p>Bambini tra i 1 e 5 anni: la dose massima è di 5 mg ogni 4 ore (pari a 0,25 ml oppure a 4 gocce)</p> <p>Si sconsiglia l'impiego nei bambini di età inferiore a 1 anno.</p> <p><b>Sciroppo:</b> Bambini tra i 6 e i 12 anni: La dose massima è di 5-10 mg (2,5-5 ml) ogni 4 ore</p> <p>Bambini tra i 1 e 5 anni: La dose massima è di 5 mg (2,5 ml) ogni 4 ore</p> <p>Si sconsiglia l'impiego nei</p>	<p>Utilizzo nel trattamento del dolore per os e rettale a partire da 1 mese. Utilizzo come analgesico adiuvante per via epidurale nel bambino.</p> <p>Utilizzo nel trattamento della sindrome da astinenza neonatale (NAS)</p>	<p>BNF                      Association of Paediatric Anesthetists (APA): good practice in postoperative and procedural pain (2008).  <a href="http://www.apagbi.org.uk/">http://www.apagbi.org.uk/</a>                      Kart T et al. Recommended use of morphine in neonates, infants and children based on literature review: part 1 - Pharmacokinetics. Paediatr Anaesth 1997a;7(1):5-11                      Kart T et al. Recommended use of morphine in neonates, infants and children based on literature review: part 2 - Clinical use. Paediatr Anaesth 1997b;7(2):93-101                      Stuth EA et al. Paediatr Anaesth. 2011;21:441-53                      The effect of caudal vs intravenous morphine on early extubation and postoperative analgesic requirements for stage 2 and 3 single-ventricle palliation: a double blind randomized trial.</p> <p>Neonatal Abstinence Syndrome-Clinical Practice</p>	<p>Indicata in premedicazione per via im e ev sopra 1 mese di vita. Indicata nel trattamento del dolore acuto per via ev dall'età neonatale. Indicata per dolore cronico e cure palliative per os, per via rettale, sc e im al di sopra di 1 mese.</p>	<p>Indicata nel trattamento del dolore per via sc, ev dall'età neonatale, per os e rettale a partire da 1 mese.</p> <p>Indicata nel trattamento della sindrome da astinenza neonatale da oppiacei per os</p>	<p>L'utilizzo della morfina in tutte le età è richiesto anche nella therapeutic need list.</p>



ALLEGATO P3 – Aggiornamento parziale Aprile 2014

Principi attivi	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Utilizzo off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno dell'indicazione terapeutica richiesta	Indicazione pediatrica Guida Uso Farmaci nei Bambini 2003	Indicazione pediatrica BNF for Children 2010-2011	Note
	bambini di età inferiore a 1 anno.			<p>Guide- March 2012.                      Provincial Council for Maternal and Child Health                      Neonatal Abstinence Syndrome Guidelines, NSWHealth 2002                      Neonatal Abstinence Syndrome Guidelines, Queensland Maternity and Neonatal Guidelines, Agosto 2010                      Opiate treatment for plate withdrawal in newborn infants, Osborn DA et al. Cochrane Collaboration 2010.                      Neonatal abstinence syndrome. Jansson et al. Pediatrics 2012                      Update on the pharmacologic management of neonatal abstinence syndrome. Bio et al. Journal of Perinatology 2011.                      AAP " Neonatal drug withdrawal" Pediatrics 1998;101 (6): 1079-1088.                      Osborn DA, Jeffrey HE, Cole M. "Opiate treatment for opiate withdrawal in newborn infants".                      Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3)</p>			

