

## Nota 95

<p>Farmaci per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ la cheratosi attinica:<ul style="list-style-type: none"><li>- diclofenac 3% in ialuronato di sodio</li></ul></li> <li>▪ la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica:<ul style="list-style-type: none"><li>- Imiquimod crema 3,75%</li><li>- Ingenolo mebutato gel</li></ul></li></ul>	<p>La prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero <math>\geq 6</math>.</p> <p>Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diclofenac 3% in ialuronato di sodio<sup>#</sup></li><li>- Imiquimod 3,75%</li><li>- Ingenolo mebutato*</li></ul> <p>Per localizzazioni al tronco e/o alle estremità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diclofenac 3% in ialuronato di sodio<sup>#</sup></li><li>- Ingenolo mebutato *</li></ul> <p># non devono essere applicati più di 8 g al giorno * ogni singolo trattamento può interessare al massimo 2 superfici non contigue ognuna di dimensioni fino a 25 cm<sup>2</sup></p> <p>La scelta di iniziare un trattamento farmacologico in alternativa ad un trattamento fisico (crioterapia e curettage) dovrà tener conto della possibilità di una corretta somministrazione e gestione degli eventi avversi. Non sono attualmente disponibili confronti diretti tra i trattamenti farmacologici topici che consentano di definire la superiorità di un farmaco rispetto all'altro; la scelta del trattamento dovrà considerare le caratteristiche dei pazienti in rapporto ai criteri di reclutamento degli studi clinici, i dati di sicurezza disponibili, le criticità e i tempi della somministrazione in termini di modalità di utilizzo e in rapporto all'obiettivo clinico.</p> <p>I Pazienti per ogni trattamento scelto dovranno essere edotti dei benefici e dei rischi.</p>
---	--